



Paardenweide

Alleen het beste voor jouw paard

Het juiste graszaad is een belangrijk onderdeel van een goede paardenweide. Kies enkel voor een grasmengsel dat speciaal is samengesteld voor paarden. Met het juiste graszaad leg je een sterke grasmat aan en voorkom je onnodig problemen zoals ziektes, zandkoliek of blessures.

Perceel

- Voor een paardenweide worden percelen met een doorlatende ondergrond of een zanderige grond aanbevolen. Maak het perceel eerst goed los en onkruidvrij.
- Bij veel onkruiden kan ook een herbicide worden toegepast. Hierna kan het inzaaien beginnen.

Zaaien

Zaaibed	Egaal en vast zaaibed voor voldoende vocht om te kiemen.
Zaaimoment	Maart - september
Zaadiepte	1,0 - 1,5 cm
Zaadichtheid	Inzaai: 60-80 kg/ha Doorzaai: 30-40 kg/ha
Zaaitechniek	Zaaien kan met een machine; kleine percelen kunnen met de hand ingezaaid worden. Let erop dat het zaad goed gelijkmatig verdeeld wordt. Probeer het in- of doorzaaien te plannen vóór een regenbui zodat het gras direct kan kiemen. Na het in- of doorzaaien is het verstandig de bodem aan te rollen zodat de zaden goed in contact komen met de bodem.

Bemesting

Zodra het gras op komt, laat je het gras eerst groeien tot 15 cm en maai je het gras eerst een keer af. Bij normale groeiomstandigheden duurt dit ongeveer 2 maanden. De eerste bemesting is aan te raden bij een grashoogte van 6 tot 8 cm.



Bemesting

Dierlijke mest: Dierlijke mest bevat veel nutriënten die noodzakelijk zijn voor een goede groei van een paardenweide. Daarom adviseren we in het voorjaar 2x een basisbemesting uit te voeren met dierlijke mest. Bij voorkeur rundveedrijfmest.

Deze mestsoort beschikt over de juiste nutriënten, brengt organische stof en geeft relatief snel effect. De eerste bemesting is aan te raden bij een grashoogte van 6-8 cm.

Maart (wanneer de bodem het toelaat): 15-20 m³/ha

Mei/juni: 10-15 m³/ha

Kunstmest: In sommige gevallen kan het verstandig zijn om naast de basisbemesting ook nog kunstmest toe te dienen. De kunstmest wordt toegepast om bij te sturen op bepaalde nutriënten. Dit is afhankelijk van de situatie. Een bodemonderzoek kan ondersteunen bij het maken van een bemestingsplan.

Paardenweide kalender

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Onderhoud			Slepen/rollen				Paardenweide maaien					
Onkruidbestrijding			Mechanisch/chemisch									
Basisbemesting			Basisbemesting									
Extra bemesting						evt. bodemanalyse						
Doorzaaien			Doorzaaien				Doorzaaien					
Inzaaien					Inzaaien met COUNTRY Horse							

← optimale weidetijd →

Onderhoud

Weide slepen/wiedeggen: Door de weide te slepen in het voorjaar en de zomer wordt de kwaliteit van de paardenweide verbeterd. Een weidesleep zorgt er namelijk voor dat oneffenheden zoals molshopen worden geëgaliseerd. Daarnaast wordt er lucht in de bodem gebracht en plantenresten worden verwijderd waardoor de grasmat zich beter zal ontwikkelen.

Bloten: Minder smakelijke (onkruid)planten worden minder goed gegeten bij begrazing. Om een smakelijke zode te behouden moeten deze planten soms worden afgemaaid: bloten. Daarnaast biedt lang gras bescherming aan larven die voor worminfecties zorgen. Door te bloten kan de kans op worminfecties worden verminderd.

Doorzaaien: Door betreding van de paarden en/of externe omstandigheden zoals droogte of winterschade kunnen er open plekken in een paardenweide ontstaan. Op deze plekken krijgen onkruiden en onkruidgrassen de kans om zich te vestigen. Als dit het geval is adviseren wij om de weide door te zaaien. De beste periode hiervoor is maart/april of augustus/september. Gebruik hiervoor 30-40 kg COUNTRY Horse Grass Balance of COUNTRY Horse Low Fructose Mix.